

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。

## 「使用上の注意」改訂のお知らせ

2023年2月

発売元：光製薬株式会社  
製造販売元：シオノケミカル株式会社

β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤  
日本薬局方 注射用タゾバクタム・ピペラシリン  
処方箋医薬品<sup>注)</sup>

# タゾピペ®配合静注用2.25「SN」

# タゾピペ®配合静注用4.5「SN」

注)注意－医師等の処方箋により使用すること

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、表記製剤につきまして、2023年2月14日付薬生安通知により下記のとおり電子化された添付文書を改訂致しますのでご案内申し上げます。

今後のご使用に際しましては、最新の電子添文をご参照下さいますようお願い申し上げます。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

●改訂箇所( ):改訂箇所

改訂後	改訂前
<p style="text-align: center;"><b>【使用上の注意】</b></p> <p>4. 副作用 本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。</p> <p>(1)重大な副作用(頻度不明) 1)～10)(省略)</p> <p>11)血球貪食性リンパ組織球症(血球貪食症候群) <u>血球貪食性リンパ組織球症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、発熱、発疹、神経症状、脾腫、リンパ節腫脹、血球減少、LDH 上昇、高フェリチン血症、高トリグリセリド血症、肝機能障害、血液凝固障害等の異常が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。</u></p> <p>(2)その他の副作用 (省略)</p>	<p style="text-align: center;"><b>【使用上の注意】</b></p> <p>4. 副作用 本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。</p> <p>(1)重大な副作用(頻度不明) 1)～10)(省略)</p> <p>(2)その他の副作用 (省略)</p>

## 【改訂理由】

## 「副作用」の項

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知(2023年2月14日付)に基づき、「副作用」の項を改訂致しました。

- 今回の改訂内容につきましては医薬品安全対策情報(DSU)No. 315(2023年3月)に掲載される予定です。
- 改訂後の電子添文の情報は医薬品医療機器総合機構ホームページ <https://www.pmda.go.jp/>並びに弊社ホームページ <https://www.hikari-pharm.co.jp/>に掲載されます。
- 添付文書閲覧アプリ「添文ナビ®」を用いて以下のGS1コードを読み取ることで、医薬品医療機器総合機構ホームページ上の最新の電子添文をご覧いただけます。

タゾピペ配合静注用「SN」



(01)04987186863017