

使用上の注意改訂のお知らせ

合成セファロスポリン製剤

日本薬局方 注射用セファゾリンナトリウム

セファゾリンNa注射用 1g 「イセイ」 CEFAZOLIN SODIUM for Injection 1g “ISEI”

処方箋医薬品^{注)}

注) 注意—医師等の処方箋により使用すること

発売元

光製薬株式会社

東京都台東区今戸 2 丁目 11 番 15 号

TEL: 03-3874-9351 FAX: 03-3871-2419

製造販売元

コーアイセイ株式会社

山形県山形市若葉町 13 番 45 号

TEL: 023-622-7755 FAX: 023-624-4717

この度、標記製品の使用上の注意を改訂いたしましたのでご案内申し上げます。
ご使用に際しましては、以下の改訂内容をご参照いただきますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容 [____部：自主改訂扱いによる改訂]

改訂後	改訂前
11. 副作用 (省略) 11.1 重大な副作用 11.1.1 (省略) 11.1.2 アナフィラキシー (0.1%未満) 呼吸困難、全身潮紅、血管性浮腫、蕁麻疹等があらわれることがある。[8.2参照] 11.1.3～11.1.10 (省略) 11.2 その他の副作用 (省略)	11. 副作用 (省略) 11.1 重大な副作用 11.1.1 (省略) 11.1.2 アナフィラキシー (0.1%未満) 呼吸困難、全身潮紅、血管浮腫、蕁麻疹等があらわれることがある。[8.2参照] 11.1.3～11.1.10 (省略) 11.2 その他の副作用 (省略)

その他の項目は現行のとおりです。

2. 改訂理由

「血管浮腫」を厚生労働省が発行している重篤副作用疾患別対応マニュアルや学会ガイドライン等での用語に倣い、「血管性浮腫」へ記載整備いたしました。

最新の電子添文は、医薬品医療機器総合機構ホームページ (<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>) 並びに弊社ホームページ (<https://www.hikari-pharm.co.jp/>) に掲載いたします。

また、添付文書閲覧アプリ「添文ナビ」で、以下のGS1 バーコードを読み取ることで最新の電子添文をご覧いただけます。

セファゾリン Na 注射用 1g 「イセイ」



(01)14987186766018